



WSKAZÓWKI DO STOSOWANIA W DOMU DLA PACJENTA Z ZAŁOŻONĄ KANIULĄ

Aby nie doszło do uszkodzenia, naruszenia kaniuli znajdującej się w naczyniu żylnym proszę:

- uważać przy wykonywaniu czynności codziennych tj: ubieranie się, kąpiel,
- nie obciążać ręki z wkłuciem np: ćwiczeniami, noszeniem ciężkich zakupów,
- nie rozwiązywać, odklejać opatrunku,
- na czas utrzymania kaniuli ograniczyć aktywność fizyczną.

Proszę zwracać uwagę czy nie występują:

- ból, pieczenie w okolicy wkłucia,
- przesunięcie kaniuli,
- zaczerwienienie, obrzęk skóry w okolicy wkłucia,
- krwawienie z miejsca założenia kaniuli.

Jeżeli zauważą Państwo jeden z tych objawów proszę zgłosić się do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki w gabinecie zabiegowym

Opatrunek wokół miejsca wkłucia może zmienić tylko osoba przeszkolona przez pielęgniarkę.

Pacjent do zmiany opatrunku powinien zaopatrzyć się w:

- jałowe rękawice
- jałowy materiał opatrunkowy (sterylne gaziki 5cmx5cm, 7cmx7cm),
- jałowy roztwór 0.9% Na Cl (fizjologiczny roztwór soli),
- środek dezynfekujący,
- bandaż.

Przed zmianą opatrunku zawsze należy pamiętać o umyciu i zdezynfekowaniu rąk.

W razie wątpliwości zawsze mogą Państwo liczyć na fachową pomoc personelu Zakładu Radioterapii.

Gabinet zabiegowy czynny jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 15.00
telefon 85-66-46-796